




## Introduction

- La 9<sup>e</sup> sortie de comptage organisée dans le cadre du projet SARG (Suivi de l'Avifaune terrestre de Rothéneuf au Grouin) a eu lieu mercredi 20 mai 2026.
- Le temps était beau, doux et peu venteux
- Les 7 parcours sont rappelés [sur cette carte du SARG](#).
- Le projet et ses objectifs sont expliqués dans [ce document en ligne](#).

Les équipes ont débuté leurs observations vers 7:30 conformément au protocole imposant un démarrage matinal pour maximiser les détections par vocalises aviaires. Cette session est la 3e de l'année 2026 (sur les six prévues au calendrier).



## Résultats

**1 026 individus** ont été dénombrés, appartenant à **56 espèces**, sur l'ensemble des 7 secteurs (725 contacts).

Équipe	Effectifs	Richesse (S)	Contacts
Besnard	114	28	88
Courtilions	72	30	64
Dunes	202	38	140
Esnoux	169	35	122
Grouin	125	28	103
Marais	109	27	82
Varde	235	29	126
<b>TOTAL</b>	<b>1 026</b>	<b>56</b>	<b>725</b>

*Effectifs totaux, richesse spécifique (Nbre d'espèces) et nombre de contacts par site*

Les Dunes de Roz Ven présentent la richesse spécifique la plus élevée (S = 38 espèces)  
Le Marais de la Basse Ville Énoux présente la richesse spécifique la plus faible (S = 27 espèces).

La Pointe de la Varde enregistre les effectifs absolus les plus élevés (235 individus).

## Analyse par espèces

### Espèces les plus abondantes (tous sites cumulés)

Espèce	Nom scientifique	Effectif cumulé
<i>Pigeon ramier</i>	<i>Columba palumbus</i>	106
<i>Merle noir</i>	<i>Turdus merula</i>	84
<i>Linotte mélodieuse</i>	<i>Linaria cannabina</i>	73
<i>Hirondelle rustique</i>	<i>Hirundo rustica</i>	48
<i>Pouillot véloce</i>	<i>Phylloscopus collybita</i>	45
<i>Moineau domestique</i>	<i>Passer domesticus</i>	44
<i>Troglodyte mignon</i>	<i>Troglodytes troglodytes</i>	39
<i>Fauvette à tête noire</i>	<i>Sylvia atricapilla</i>	37
<i>Chardonneret élégant</i>	<i>Carduelis carduelis</i>	33
<i>Pinson des arbres</i>	<i>Fringilla coelebs</i>	32
<i>Bouscarle de Cetti</i>	<i>Cettia cetti</i>	31
<i>Tarier pâtre</i>	<i>Saxicola rubicola</i>	30
<i>Accenteur mouchet</i>	<i>Prunella modularis</i>	28
<i>Hirondelle de rivage</i>	<i>Riparia riparia</i>	25
<i>Mésange bleue</i>	<i>Cyanistes caeruleus</i>	25

### Espèces présentes sur les 7 sites

**Huit espèces** ont été contactées simultanément sur l'ensemble des sept sites.

Espèce	Nom scientifique	Eff.
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	106
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	84
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	48
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	45
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	37
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	31
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	28
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	16

## Espèces à distribution restreinte (un seul site)

**Huit espèces** n'ont été détectées que sur un unique site lors de cette session.

Espèce	Nom scientifique	Site unique	n
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Dunes	1
Choucas des tours	<i>Coloeus monedula</i>	Dunes	8
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	Besnard	1
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	Esnoux	2
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	Dunes	1
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Courtillons	1
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	Grouin	1
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	Dunes	5

## Espèces remarquables

► Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)

Sites / effectifs : Besnard (4 ind.), Esnoux (5 ind.), Marais (7 ind.) — total 16 individus (3 sites)

► Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)

Sites / effectifs : Dunes (2 ind.), Esnoux (1 ind.), Grouin (2 ind.), Marais (4 ind.), Varde (2 ind.) — total 11 individus (5 sites)

► Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)

Sites / effectifs : Marais (10 ind.), Varde (15 ind.) — total 25 individus (2 sites)

► Fauvette grisette (*Curruca communis*)

Sites / effectifs : Dunes (2 ind.), Grouin (6 ind.), Marais (1 ind.) — total 9 individus (3 sites)

► Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)

Sites / effectifs : Courtillons (1 ind.), Dunes (1 ind.) — total 2 individus (2 sites)

► Hibou moyen-duc (*Asio otus*)

Site / effectif : Pointe du Grouin (Cancalle) — 1 individu

Contact remarquable en plein jour à la Pointe du Grouin.

► Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)

Sites / effectifs : Courtillons (2 ind.), Dunes (3 ind.), Esnoux (2 ind.), Grouin (2 ind.) — total 9 individus (4 sites)

## Résultats détaillés par site

### Île Besnard

28 espèces – 88 contacts

Espèce	Nom scientifique	n ind.	% site
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	13	11.4 %
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	11	9.6 %
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	10	8.8 %
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	10	8.8 %
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	5	4.4 %
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	5	4.4 %
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	5	4.4 %
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	5	4.4 %
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	4	3.5 %
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	4	3.5 %
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	4	3.5 %
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	4	3.5 %
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	4	3.5 %
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	4	3.5 %
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	3	2.6 %
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	3	2.6 %
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	3	2.6 %
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	3	2.6 %
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	2	1.8 %
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	2	1.8 %
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	2	1.8 %
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	2	1.8 %
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	1	0.9 %
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	1	0.9 %
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	1	0.9 %
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	1	0.9 %
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	1	0.9 %
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	1	0.9 %

### Les Courtilons (Saint-Coulomb)

30 espèces – 64 contacts

Espèce	Nom scientifique	n ind.	% site
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	7	9.7 %
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	6	8.3 %
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	6	8.3 %
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	4	5.6 %
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	4	5.6 %

Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	3	4.2 %
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	3	4.2 %
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	3	4.2 %
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	3	4.2 %
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	3	4.2 %
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	2	2.8 %
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	2	2.8 %
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	2	2.8 %
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	2	2.8 %
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	2	2.8 %
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	2	2.8 %
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	2	2.8 %
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	2	2.8 %
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	2	2.8 %
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	2	2.8 %
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	1	1.4 %
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	1	1.4 %
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	1.4 %
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	1	1.4 %
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1	1.4 %
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	1.4 %
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	1	1.4 %
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	1	1.4 %
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	1	1.4 %
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	1	1.4 %

## Dunes

### 38 espèces – 140 contacts

Espèce	Nom scientifique	n ind.	% site
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	26	12.9 %
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	21	10.4 %
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	17	8.4 %
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	10	5.0 %
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	9	4.5 %
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	9	4.5 %
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	9	4.5 %
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	8	4.0 %
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	8	4.0 %
Choucas des tours	<i>Coloeus monedula</i>	8	4.0 %
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	8	4.0 %
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	6	3.0 %
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	6	3.0 %
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	5	2.5 %
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	5	2.5 %

Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	4	2.0 %
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	4	2.0 %
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	4	2.0 %
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	4	2.0 %
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	3	1.5 %
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	3	1.5 %
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	3	1.5 %
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	3	1.5 %
Fauvette grisette	<i>Curruca communis</i>	2	1.0 %
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	2	1.0 %
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	2	1.0 %
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	2	1.0 %
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	1	0.5 %
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1	0.5 %
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	1	0.5 %
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	1	0.5 %
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	1	0.5 %
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	1	0.5 %
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	1	0.5 %
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	1	0.5 %
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	1	0.5 %
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1	0.5 %
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	1	0.5 %

## Val Esnoux

**35 espèces – 122 contacts**

Espèce	Nom scientifique	n ind.	% site
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	16	9.5 %
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	14	8.3 %
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	13	7.7 %
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	13	7.7 %
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	12	7.1 %
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	11	6.5 %
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	11	6.5 %
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	10	5.9 %
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	6	3.6 %
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	5	3.0 %
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	5	3.0 %
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	5	3.0 %
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	4	2.4 %

Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	4	2.4 %
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	3	1.8 %
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	3	1.8 %
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	3	1.8 %
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	3	1.8 %
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	2	1.2 %
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	2	1.2 %
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	2	1.2 %
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	2	1.2 %
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	2	1.2 %
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	2	1.2 %
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	2	1.2 %
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	2	1.2 %
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	2	1.2 %
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	2	1.2 %
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	2	1.2 %
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	1	0.6 %
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	1	0.6 %
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	1	0.6 %
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	1	0.6 %
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	1	0.6 %
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	1	0.6 %

## Pointe du Grouin

**28 espèces – 103 contacts**

Espèce	Nom scientifique	n ind.	% site
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	22	17.6 %
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	15	12.0 %
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	11	8.8 %
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	7	5.6 %
Fauvette grisette	<i>Curruca communis</i>	6	4.8 %
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	6	4.8 %
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	5	4.0 %
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	5	4.0 %
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	5	4.0 %
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	5	4.0 %
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	4	3.2 %
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	4	3.2 %
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	4	3.2 %
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	3	2.4 %
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	3	2.4 %
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	2	1.6 %
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	2	1.6 %
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	2	1.6 %

Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	2	1.6 %
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	2	1.6 %
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	2	1.6 %
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	2	1.6 %
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	1	0.8 %
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	1	0.8 %
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	1	0.8 %
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	1	0.8 %
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1	0.8 %
Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>	1	0.8 %

## Marais de la Basse Ville Énoux

**27 espèces – 82 contacts**

Espèce	Nom scientifique	n ind.	% site
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	10	9.2 %
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	9	8.3 %
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	8	7.3 %
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	7	6.4 %
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	7	6.4 %
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	7	6.4 %
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	7	6.4 %
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	6	5.5 %
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	5	4.6 %
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	5	4.6 %
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	4	3.7 %
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	4	3.7 %
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	4	3.7 %
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	4	3.7 %
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	3	2.8 %
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	3	2.8 %
Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>	3	2.8 %
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	2	1.8 %
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	2	1.8 %
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	2	1.8 %
Fauvette grisette	<i>Curruca communis</i>	1	0.9 %
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	1	0.9 %
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	1	0.9 %
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	1	0.9 %
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	1	0.9 %
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	0.9 %
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	1	0.9 %

## Pointe de la Varde

29 espèces – 126 contacts

Espèce	Nom scientifique	n ind.	% site
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	38	16.2 %
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	24	10.2 %
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	21	8.9 %
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	19	8.1 %
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	18	7.7 %
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	15	6.4 %
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	13	5.5 %
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	12	5.1 %
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	11	4.7 %
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	8	3.4 %
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	7	3.0 %
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	6	2.6 %
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	5	2.1 %
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	5	2.1 %
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	5	2.1 %
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	4	1.7 %
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	3	1.3 %
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	3	1.3 %
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	3	1.3 %
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	3	1.3 %
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	2	0.9 %
Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>	2	0.9 %
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	2	0.9 %
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	1	0.4 %
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	1	0.4 %
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	1	0.4 %
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1	0.4 %
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	1	0.4 %
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	1	0.4 %

## Liste complète des espèces rencontrées sur les 7 sites

Espèce	Besnard	Courtillons	Dunes	Esnoux	Grouin	Marais	Varde	Total
Tadorne de Belon	3	2	—	—	—	—	—	5
Canard colvert	4	2	—	16	2	—	—	24
Faisan de Colchide	2	—	1	1	—	—	—	4
Grand Cormoran	—	1	—	—	—	—	—	1
Aigrette garzette	3	—	—	—	—	—	1	4
Buse variable	—	1	—	—	—	1	—	2
Gallinule poule-d'eau	1	—	—	1	—	—	—	2
Foulque macroule	—	—	—	2	—	—	—	2
Goéland argenté	5	—	—	—	—	—	—	5
Pigeon ramier	11	3	26	6	15	7	38	106
Tourterelle turque	—	1	6	—	3	—	3	13
Tourterelle des bois	1	3	1	—	—	—	—	5

Coucou gris	1	—	—	—	—	—	—	1
Hibou moyen-duc	—	—	—	—	1	—	—	1
Martinet noir	—	2	—	4	—	6	5	17
Pic vert	—	1	—	2	—	1	—	4
Pic épeiche	—	—	1	3	—	—	—	4
Alouette des champs	—	—	1	2	—	8	1	12
Hirondelle de rivage	—	—	—	—	—	10	15	25
Hirondelle rustique	2	2	17	12	7	2	6	48
Hirondelle de fenêtre	—	2	4	—	1	—	—	7
Pipit farlouse	—	—	—	—	—	3	13	16
Pipit maritime	—	—	—	—	1	—	2	3
Troglodyte mignon	4	4	10	10	6	5	—	39
Accenteur mouchet	2	3	8	2	1	4	8	28
Rougegorge familier	4	1	3	4	—	2	3	17
Tarier pâtre	—	—	2	3	2	5	18	30
Merle noir	5	7	21	14	11	7	19	84
Grive musicienne	2	—	3	3	1	—	4	13
Bouscarle de Cetti	4	4	4	5	4	3	7	31
Cisticole des joncs	—	2	—	2	5	2	11	22
Rousserolle effarvatte	4	—	—	5	—	7	—	16
Hypolaïs polyglotte	—	—	2	1	2	4	2	11
Fauvette à tête noire	5	2	9	13	3	4	1	37
Fauvette des jardins	—	2	3	2	2	—	—	9
Fauvette grisette	—	—	2	—	6	1	—	9
Pouillot véloce	4	6	9	11	5	7	3	45
Roitelet à triple bandeau	—	—	1	2	—	—	—	3
Gobemouche gris	—	1	1	—	—	—	—	2
Mésange bleue	10	1	1	11	1	—	1	25
Mésange charbonnière	5	—	4	2	—	1	5	17
Grimpereau des jardins	3	1	1	2	—	—	—	7
Geai des chênes	1	2	—	3	—	1	—	7
Pie bavarde	1	3	8	—	2	—	1	15
Choucas des tours	—	—	8	—	—	—	—	8
Corneille noire	3	3	3	1	2	1	3	16
Grand Corbeau	—	—	1	—	—	—	—	1
Étourneau sansonnet	—	—	5	—	—	—	—	5
Moineau domestique	10	6	1	1	5	—	21	44
Pinson des arbres	13	1	8	5	4	1	—	32
Serín cini	—	2	6	—	4	—	1	13
Verdier d'Europe	—	1	2	1	2	—	5	11
Chardonneret élégant	1	—	9	2	5	4	12	33
Linotte mélodieuse	—	—	5	13	22	9	24	73
Bouvreuil pivoine	—	—	1	—	—	—	—	1
Bruant zizi	—	—	4	2	—	3	2	11

## Conclusion

Merci aux observateurs qui ont bien travaillé sur le terrain avec leurs yeux, leurs oreilles, leurs jumelles, leur longue-vue, leur téléphone et Naturalist. L'envoi des données pour analyse et synthèse se fait désormais (presque) sans encombre. Le plantage du site Faune-France, la veille de la sortie, n'aura fait que retarder la réception des données et la rédaction de ce rapport.

Nous vous encourageons chaleureusement à faire remarques et suggestions à [Pascale](#) ou à [Michel](#).



Fait à Saint-Malo le 26 mai 2026.  
Pascale et Michel Arnould  
Groupe d'ornithologie  
Antenne Rance-Émeraude